


Impftermine

für Säuglinge, Kinder und Jugendliche unter beispielhafter Anwendung des produktneutralen Impfkaltenders der STIKO^{1,2} auf Impfstoffe von GlaxoSmithKline****
(Alternativen)



Impfungen	Alter in Wochen 6	Vollendeter Lebensmonat (2,3)			Vollendetes Lebensjahr (2,3)			
		2	3	4	11-14	15-23	5-6	9-17
Grundimmunisierung*** z.B. mit: Rotarix® (Rotateq) – Rotaviren	1. Impfung	2. Impfung	(3. Impfung) nur Rotateq					
Grundimmunisierung* z.B. mit: Infanrix hexa® (Hexyon) – Diphtherie – Tetanus – Pertussis – Hepatitis B – Poliomyelitis – Haemophilus Influenzae Typ b (Hib)		1. Impfung	2. Impfung	3. Impfung	4. Impfung		Auffrischimpfung z.B. mit: Boostrix® – Tetanus – Diphtherie – Pertussis	Auffrischimpfung z.B. mit: Boostrix® Polio – Tetanus – Diphtherie – Pertussis – Poliomyelitis
z.B. mit: Synflorix® (Prevenar 13) – Pneumokokken (4,11)		1. Impfung	Frühgeb.	2. Impfung	3. Impfung			
Grundimmunisierung** z.B. mit: Priorix® & Varilrix®/Priorix-Tetra® – Masern – Mumps – Röteln – Varizellen (Varivax)					1. Impfung	2. Impfung (5,6)		
Meningokokken C					Impfung ab dem vollendeten 12. Lebensmonat (3)			
Cervarix® (9,10) (Gardasil 9) Humane Papillomviren								Mädchen 9-14 Jahre (9) 2 Impfungen: 0 und 6 Monate Mädchen 15 Jahre und älter (9,10) 3 Impfungen: 0-1-6 Monate

* mögl. mit 6fach-Kombinationsimpfstoff ** mögl. mit 4fach-Kombinationsimpfstoff bzw. bei 1. Impfung mit MMR- und V-Impfstoff zeitgleich

- Gemäß den Impfempfehlungen der Ständigen Impfkommission am Robert Koch-Institut (STIKO), Stand August 2016. Quelle: Epidemiologisches Bulletin 34/2016 und Ergänzung
- Versäumte Impfungen sollten möglichst bald nachgeholt werden
- Gleichbedeutend mit dem Beginn des folgenden Lebensmonats/-jahres
- Koadministrationsmöglichkeiten vgl. Fachinformation
- Mindestabstand zwischen den Impfungen 4 Wochen

- Impfung entsprechend Herstellerangaben
- Ungeimpfte ohne durchgemachte Windpockenerkrankung
- Koadministrationsmöglichkeiten vgl. Fachinformation
- Standardimpfung für Mädchen - Grundimmunisierung mit 2 Impfungen: 9-14 Jahre im Monat 0 und 6 Grundimmunisierung mit 3 Impfungen ab 15 Jahre

*** 2 oder 3 orale Gaben je nach verwendeten Impfstoff

- Spätestens bis zum vollendeten 18. Lebensjahr (d.h. bis zum Tag vor dem 18. Geburtstag) sollen versäumte Impfungen gegen HPV nachgeholt werden
- Frühgeborene (Geburt vor der vollendeten 37. Schwangerschaftswoche) sollen mit insgesamt 4 Impfstoffdosen im Alter von 2, 3, 4 und 11 – 14 Monaten (3+1-Impfschema) geimpft werden

**** Für Impfungen von anderen Herstellern beachten Sie ggf. abweichende Impfschemata

SCHÜTZEN
IMPFFEN

